

057 *Paronychia capitata* (L.) Lam.

Deslinde, Pina de Ebro (05/05/2013)

***Paronychia capitata* (L.) Lam.**

NOMBRE VULGAR

Nevadilla, sanguinaria

DESCRIPCIÓN

3-15 cm. Hierba con cepa leñosa en la base, con tallos postrados y muy ramificados, pelosos; hojas con peciolo muy corto, con pelosidad, con punta aguda; flores agrupadas en grupos globosos, ocultas por las brácteas; sépalos desiguales entre sí, lineares.



P. capitata. Detalle de los sépalos

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Caryophyllaceae.

Hojas generalmente simples y enteras.

Hojas con estípulas pequeñas.

Flores de dos tipos:

a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.

b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados en la base y ovario súpero.

Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.

Género *Paronychia*

Brácteas florales de consistencia seca y escariosa, más grandes que las flores.

Hojas opuestas o verticiladas.

Inflorescencias en grupos laterales, axilares o finales.

Flores sin pétalos

Frutos secos con una sola semilla.

Paronychia capitata

Sépalos desiguales, no terminados en una arista o capuchón.

Sépalos sin banda central castaña.

ESPECIES SIMILARES

Las brácteas escariosas permiten reconocer con facilidad al género *Paronychia*. *P. capitata* convive en algunos lugares con *Paronychia argentea* Lam., planta muy parecida pero de aspecto más verdoso y con sépalos con banda central castaña y con forma de capucha.

057 *Paronychia capitata* (L.) Lam.



Paronychia argentea

GALERÍA FOTOGRÁFICA



P. capitata. Detalle de la hoja: haz.



P. capitata. Detalle de la hoja: envés



P. capitata. Detalle de grupo floral

DISTRIBUCIÓN

Región mediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de claros en zonas de monteriza, también en pedregales y gravas. Florece desde abril hasta junio.

COMENTARIOS Y USOS

Comentar primero que en la medicina popular no se suele distinguir a esta especie de *Paronychia argentea* entendiéndose ambas bajo el término de “nevadilla”. En cocimiento, la nevadilla se utiliza para purificar la sangre en casos de tensión alta; la planta fresca machacada puede aplicarse sobre las heridas ayudando a su encoramiento. En recetarios medievales, estas plantas eran recomendadas para usos tales como, introducida dentro, cerrar la natura de la mujer que no sujeta la simiente del varón, como infusión para evitar el ser sangrado, para combatir la cefalea puesta en la cabeza y cubierta por una toca o, quemada, ponerse encima para que el humo alivie el dolor de las almorranas.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

057 *Paronychia capitata* (L.) Lam.

P. capitata. Detalle de grupo floral: vista posterior



P. capitata. Detalle de la flor, sépalos y brácteas.



P. capitata. Detalle de grupo floral con frutos