

061 *Atriplex rosea* L.

Marco Antonio, Pina de Ebro (16/08/2013)

Atriplex rosea* L.*NOMBRE VULGAR**

Armuelle blanco

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba blanquecina de tallos ascendentes; hojas de forma rómbico-ovadas y margen entero o ligeramente dentado; flores axilares o en inflorescencias terminales; bractéolas que cubren los frutos rosadas o blanquecinas, generalmente con forma de rombo, dentadas en la base, dorso con pequeños tubérculos y soldadas hasta la mitad.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Chenopodiaceae**

Hojas simples, sin estípulas, a veces crasas o inaparentes.

Flores con piezas poco vistosas, con perianto sepaloideo rodeado generalmente por una envoltura de 5 piezas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con igual o menor número de estambres que de piezas del perianto.

Frutos con una semilla.

Género *Atriplex*

Plantas sin vellosidad o cubiertas si acaso de pequeñas vesículas blancas que les dan un aspecto farinoso.

Hojas con limbo bien desarrollado.

Flores unisexuales, desnudas o con dos brácteas que semejan sépalos.

Frutos rodeados de dos brácteas triangulares o redondeadas, libres o soldadas en su parte inferior.

Atriplex rosea

Plantas herbáceas.

Hojas grisáceas, más o menos plateadas.

Bractéolas que rodean al fruto soldadas hasta la mitad y endurecidas.

ESPECIES SIMILARES

El ser una planta herbácea, estar cubiertas por un tomento blanquecino en hojas y tallos y tener las bractéolas que cubren el fruto soldadas hasta la mitad diferencian a esta especie de las demás del género *Atriplex*.

DISTRIBUCIÓN

Región mediterránea y centro y suroeste de Asia; introducida en Norteamérica y el Caribe. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Orillas de caminos y eriales con suelos removidos; también en suelos con abundancia de sales. Florece desde julio hasta octubre.

FAUNA ASOCIADA

Aelia acuminata (Prosorrhyncha). Barrido

Lygus pratensis (Prosorrhyncha). Barrido

061 *Atriplex rosea* L.**COMENTARIOS Y USOS**

En el norte de África, las semillas de esta especie y otras del género *Atriplex* se han utilizado molidas para la obtención de harinas que se consumían como pastas o en sopas.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. rosea. Detalle del tallo



A. rosea. Detalle de hoja superior: haz



A. rosea. Detalle de hoja superior: haz

061 *Atriplex rosea* L.



A. rosea. Detalle de hoja inferior: haz



A. rosea. Detalle de rama con inflorescencias



A. rosea. Detalle de hoja inferior: envés



A. rosea. Detalle de inflorescencia

061 *Atriplex rosea* L.



A. rosea. Detalle de las bractéolas de fruto



A. rosea. Detalle de las bractéolas de fruto