

**117 *Fumaria parviflora* Lam.**

Miralrío, Gelsa (12/04/2014)

***Fumaria parviflora* Lam.**

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

10-40 cm. Planta ramificada, sin vellosidad. Hojas alternas, pinnatisectas; inflorescencias subsésiles. Flores con brácteas tan largas o más largas que los pedicelos; 2 sépalos libres, dentados. 4 pétalos blancos, a veces rosáceos en la madurez. Aquenios ovoideos, aquillados, rugosos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Papaveraceae**

Plantas herbáceas, generalmente con látex.

Hojas generalmente alternas, sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.

Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.

Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.

Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.

Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Papaveraceae**

Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

**Género *Fumaria***

Plantas anuales.

Últimos segmentos foliares lineares y/o multipartidos.

Inflorescencias en racimos laxos.

Flores en racimos largos y laxos, con pedicelos cortos y de longitud uniforme.

Flores blancas o rosadas, con pétalos desiguales. Con dos estambres.

Frutos globosos, esféricos u ovoideos o, si son comprimidos, con costillas longitudinales.

***Fumaria parviflora***

Segmentos foliares generalmente lineares, de menos de 1,5 mm de anchura.

Flores menores de 9 mm (espolón incluido).

Sépalos de 1 mm de longitud o menores, profunda e irregularmente dentados.

Corola blanca.

Brácteas tan largas o más largas que los pedicelos fructíferos.

Aquenios aquillados.



*F. parviflora*: flor de color blanco con pedúnculo recto y hoja

**117 *Fumaria parviflora* Lam.****ESPECIES SIMILARES**

El tener segmentos foliares lineares, flores menores de 9 mm con sépalos de 1 mm de longitud o menores irregularmente dentados, corola blanca, brácteas tan largas o más largas que los pedicelos fructíferos y aquenios aquillados separan a esta especie de las demás del género *Fumaria* citadas en la Comarca.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de secano y herbazales anuales en lugares secos de carácter nitrófilo. Florece desde marzo hasta julio.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*F. parviflora*. Detalle de la hoja: haz



*F. parviflora*. Detalle del tallo



*F. parviflora*. Detalle de la hoja: envés



**117 *Fumaria parviflora* Lam.**



*F. parviflora*. Detalle de la inflorescencia



*F. parviflora*. Detalle de la flor



*F. parviflora*. Detalle del fruto



*F. parviflora*. Detalle de las flores



*F. parviflora*. Detalle del fruto