

117 *Platycapnos tenuiloba* Pomel

Vireta, Pina de Ebro (05/05/2013)

Platycapnos tenuiloba* Pomel*NOMBRE VULGAR**

Palomilla

DESCRIPCIÓN

10-30 cm. Hierba con hojas alternas, muy divididas; racimos subcilíndricos u obovados, muy densos: brácteas tan largas como los pedicelos; 2 sépalos libres; 4 pétalos libres, rosados, con una mancha púrpura apical; estigma con apéndice apical bifurcado y curvo; frutos aplanados, de margen grueso y superficie lisa.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Papaveraceae

Plantas herbáceas, generalmente con látex.

Hojas generalmente alternas, sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.

Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Papaveraceae**

Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.

Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.

Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.

Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

Género *Platycapnos*

Hojas con divisiones muy numerosas, más o menos lineares.

Flores blancas o rosadas, con los pétalos desiguales.

Flores en espigas o racimos muy densos.

Flores con dos estambres.

Frutos aplanados.

Platycapnos tenuiloba

Inflorescencia cilíndrica, más larga que ancha.

Flores de 7 a 8 mm.

Apéndice del estigma curvado.



P. tenuiloba. Detalle de la inflorescencia cilíndrica y apéndice del estigma arqueado.

117 *Platycapnos tenuiloba* Pomel



GALERÍA FOTOGRÁFICA

ESPECIES SIMILARES

Muy parecida a *Platycapnos spicata*, que tiene la inflorescencia globosa y el apéndice del estigma recto.



Platycapnos spicata. Detalle de la inflorescencia globosa y apéndice del estigma recto.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye por el Mediterráneo oriental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos removidos, campos de cultivo y orillas de caminos. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.



P. tenuiloba. Detalle del tallo



P. tenuiloba. Detalle de las hojas




P. tenuiloba. Detalle de la inflorescencia

117 *Platycapnos tenuiloba* Pomel



P. tenuiloba. Detalle de la flor



P. tenuiloba. Detalle de la flor



P. tenuiloba. Detalle de los frutos