

**121 *Limonium hibericum* Erben**

Vireta, Pina de Ebro (06/07/2013)

***Limonium hibericum* Erben****NOMBRE VULGAR**

Estátice

**DESCRIPCIÓN**

15-40 cm. Planta perenne, flexible. Hojas en roseta, espatuladas, con ápice romo, marchitas en la floración. Inflorescencia con muchas ramas estériles. Cáliz con tubo densamente peloso en la mitad. Pétalos de color lila.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Plumbaginaceae**

Hojas alternas o todas en roseta basal.

Flores sentadas, en capítulos o cimas espiciformes con frecuencia unilaterales.

Sépalos soldados.

Gineceo súpero terminado en varios estilos o estigmas.

**Familia Plumbaginaceae**

Estambres opuestos a los pétalos.

Anteras que se abren por hendiduras longitudinales.

Frutos monospermos, sin pico largo.

**Género *Limonium***

Hojas habitualmente reunidas en roseta basal.

Flores agrupadas en cimas ramificadas.

Cálices no glandulosos, casi completamente escariosos.

Gineceo con 5 estilos.

Estambres unidos a la corola.

***Limonium hibericum***

Plantas perennes, con cepa algo leñosa, que al secarse conservan un color verde grisáceo a verde oliváceo y siguen elásticas.

Hojas de ápice romo, redondeado o emarginado, de 7-20 mm de anchura.

Inflorescencias con varias ramas estériles (que se encuentran rematadas por una escamita de menos de 1 mm).

Espiguillas de 5,5-6,5 mm, netamente más largas que la bráctea interna.

Cáliz con pelos adpresos.



*L. hibericum*: detalle de la hoja antes de y en la floración

**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta perenne con cepa algo leñosa, que al secarse conserva un color verde grisáceo, tener hojas de ápice romo, redondeado o emarginado, de 7-20 mm de anchura, inflorescencias con varias ramas estériles (que se encuentran rematadas por una escamita de menos de 1 mm), espiguillas de 5,5-6,5 mm, netamente más largas que la bráctea interna y cáliz con pelos adpresos separan a esta especie de las demás del género *Limonium* citadas en la Comarca.

**121 *Limonium hibericum* Erben****DISTRIBUCIÓN**

Endemismo del cuadrante NE de la Península Ibérica. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de suelos ricos en sales, incluyendo los yesosos. Florece desde junio hasta septiembre.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Ononidetum tridentatae*

*Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi*

*Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*

*Salsolo vermiculatae-Pegagnetum harmalae*

*Suaedetum verae*

**FAUNA ASOCIADA**

*Staticobium* sp. (Aphidoidea). Planta nutricia

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*L. hibericum*. Detalle del tallo




*L. hibericum*. Detalle de la hoja antes de la floración: haz



*L. hibericum*. Detalle de la hoja antes de la floración: envés

# 121 *Limonium hibericum* Erben



*L. hibericum*. Detalle de la hoja en la floración: haz



*L. hibericum*. Detalle de la hoja en la floración: envés



*L. hibericum*. Detalle de rama estéril



*L. hibericum*. Detalle de rama fértil



*L. hibericum*. Detalle de la flor



*L. hibericum*. Detalle de la corola

# 121 *Limonium hibericum* Erben



*L. hibericum*. Detalle del cáliz

*L. hibericum*. Detalle del cáliz



*L. hibericum*. Detalle del cáliz



*L. hibericum*. Detalle del cáliz