

**176 *Muscari neglectum* Guss. ex Ten.**

Valdebellera, Pina de Ebro (23/04/2013)

***Muscari neglectum* Guss. ex Ten.**

**NOMBRE VULGAR**

Nazareno

**DESCRIPCIÓN**

5-20 cm. Hierba con bulbo; hojas ascendentes, con nervios paralelos; inflorescencia corta y densa; flores apicales estériles; flores fértiles de color azul-violáceo; con 6 estambres; fruto en cápsula, trilobado.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**Familia Liliaceae**

Hojas acintadas o lineares, sentadas, con nervios paralelos.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con carpelos soldados, siempre en número de 3.

Flores con 6 piezas más o menos iguales.

Flores con gineceo súpero.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Género *Muscari***

Inflorescencia no encerrada con brácteas.

Flores elevadas sobre tallos aéreos, terminales.

Corola con forma de olla, estrechadas en la boca y con los lóbulos libres muy cortos.

Frutos en cápsula.

***Muscari neglectum***

Hojas de 2 a 4 mm de anchura.

Racimo de flores denso, de menos de 5 cm de longitud.

Flores estériles apicales con pedúnculos cortos.

Flores fértiles de color azul-violeta.

Estambres insertos a la misma altura.



*M. neglectum.*

Inflorescencia densa con flores estériles apicales con pedúnculos cortos y flores fértiles de color azul-violeta.

**ESPECIES SIMILARES**

*Muscari comosum* tiene el racimo de flores laxo, flores estériles apicales con pedúnculos largos y flores fértiles de color marronado.



*M. comosum.*

Inflorescencia laxa con flores estériles apicales con pedúnculos largos y flores fértiles de color marrón.

**176 *Muscari neglectum* Guss. ex Ten.**



**DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea y oeste de Asia. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de cultivo, orillas de caminos, prados y suelos pedregosos, siempre en suelos alterados. Florece desde abril hasta junio.

**COMENTARIOS Y USOS**

En el Mediterráneo oriental los bulbos son consumidos como alimento. Los bulbos secos se han utilizado para el tratamiento de pieles enrojecidas en aplicación externa.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*M. neglectum*. Detalle de la inflorescencia



*M. neglectum*. Detalle del tallo



*M. neglectum*. Detalle de las flores estériles



*M. neglectum*. Detalle de las hojas




*M. neglectum*. Detalle de una flor fértil

**176 *Muscari neglectum* Guss. ex Ten.**



*M. neglectum*. Detalle de una flor fértil



*M. neglectum*. Detalle del fruto



*M. neglectum*. Detalle de una planta fructificada



*M. neglectum*. Detalle del fruto