

035 *Anaptychia ciliaris* (Lecanorales)

La Retuerta, Pina de Ebro (29/09/2016) en tronco de sabina albar (*Juniperus thurifera*)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Anaptychia ciliaris (L.) Koerb.

DESCRIPCIÓN

Talo foliáceo de color gris (verde en estado húmedo), con lacinias acintadas caracterizadas por la presencia de largos cilios marginales y pelos finos dispuestos densamente por la superficie del talo. Se adhiere laxamente a la corteza de los árboles sin rizinas, la cara inferior del talo es acanalada, de color claro y presenta un retículo de verrugas. Los apotecios son relativamente frecuentes, si bien es bastante habitual encontrar talos desprovistos de ellos. Su tamaño varía entre 1 y 8 mm. Son casi pedunculados, y presentan un margen bien desarrollado y un disco plano de color negro pruinoso. En ocasiones se presentan proliferaciones talinas en los márgenes de los apotecios.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento subcosmopolita. Encontrado en la corteza de una sabina albar.

COMENTARIOS Y USOS

Es una especie normalmente epífita, aunque también puede encontrarse en rocas ácidas y sus musgos asociados. En Aragón es una especie común, especialmente en bosque frescos a cierta altitud del piso supramediterráneo.

AGRADECIMIENTO

Javier Etayo Salazar (Pamplona) ha determinado los ejemplares fotografiados.

BIBLIOGRAFÍA

Calatayud, V. & Sanz, M.J., 2000. *Guía de líquenes epífitos*. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Etayo, J., 2010. Líquenes y hongos liquenícolas de Aragón. *Guineana*, 16: 1-501

Etayo, J. & Blasco-Zumeta, J., 1992. - Líquenes epífitos de zonas áridas. El sabinar de la Retuerta de Pina (Los Monegros, España). *Acta Botánica Malacitana*, 17: 67-78

<https://trepariscos-fieldnotebook.blogspot.com/1994/02/anaptychia-ciliaris.html>

035 *Anaptychia ciliaris* (Lecanorales)



L. horiza sobre tronco de sabina albar
(*Juniperus thurifera*)