

210 *Spilostethus pandurus* (Hemiptera, Lygaeidae)



Valdebellera; Pina de Ebro (20/06/2016)

NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)

DESCRIPCIÓN

9-13 mm. Cabeza y el pronoto rojos con dos gruesas líneas negras en zigzag. Hemiélitros también rojos con un patrón negro característico. Alas membranosas y pardas con diversos puntos y manchas blancuzcos. El abdomen es también rojo con marcas negras.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento prácticamente cosmopolita. Presente en toda la Comarca tanto en ambientes esteparios como de influencia del río.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Dispone de una especie de estilete hueco por el que absorbe fluidos de los que se alimenta. Estos son principalmente savia de plantas (especie fitófaga), aunque también succiona fluidos de animales muertos (saprofita). Tiene coloración aposemática que advierte a los posibles depredadores de su toxicidad. Las toxinas que almacena en su cuerpo las obtiene de numerosas plantas de las que se alimenta.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line:
<http://tubiologia.forosactivos.net/> .

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Perrier, R., 1975. *La Faune de France: Hémiptères, Anoploures, Mallophages, Lepidoptères*. Ed. Jos. Adam. Bruxelles.

Ribes, J., Blasco-Zumeta, J. & Ribes, E., 1997. Heteroptera de un sabinar de *Juniperus thurifera* L. en los Monegros, Zaragoza. *Monografías SEA*, 2: 1- 127

<https://animalandia.educa.madrid.org/ficha.php?id=3477>

GALERÍA FOTOGRÁFICA



S. pandurus