

230 *Rhyncomyia columbina* (Diptera, Calliphoridae)



Vireta; Pina de Ebro (26/06/2018)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Rhyncomyia columbina (Meigen, 1824)

DESCRIPCIÓN

6-8 mm. Frente, en su parte más estrecha, subigual a la anchura del ocelo anterior. Hipopigio de configuración normal, no estrecho y alargado, y los ápices de los cercos terminando en un ápice redondeado, pero independiente para cada uno de ellos. Fémures II y III totalmente testáceos.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo occidental. Presente en todos los ambientes de la zona.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Hacen la puesta en el suelo, en lugares ricos en humus como detritus cerca de madrigueras o estiércol. Las larvas son muy activas excavando en el suelo permaneciendo cerca de la superficie en las horas más frescas y bajando en profundidad en las calurosas. Después de la pupación, los adultos tardan en aparecer de 7 a 11 días. Los miembros de este grupo son parásitos de isópteros, himenópteros y ortópteros

AGRADECIMIENTO

Constan Escuer (Perdiguera) determinó el ejemplar de la fotografía

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

González-Mora, D. & Peris, S.V., 1988. Los Caliphoridae de España: 1: Rhiniinae y Chrysomyinae (Diptera). *Eos*, 64: 91-139

Séguy, E., 1951. *Atlas des Diptères de France*. Vols. I-II. Ed. N. Boubée. Paris.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



R. columbina



R. columbina

230 *Rhyncomyia columbina* (Diptera, Calliphoridae)



R. columbina



R. columbina



R. columbina