


050 *Erythraeus lancifer* (Trombidiformes, Erythraeidae)



E. lancifer. Larva. Vista dorsal. Fuente: Southcott, 1995.

NOMBRE VULGAR

-

Erythraeus lancifer Southcott, 1995

DESCRIPCIÓN

Larva 375 µm. Escudo dorsal con borde posterior engrosado; borde anterior aplanado o levemente emarginado; escudo con finas porosidades; escudo posterior ligeramente setuloso; setas estechas, puntiagudas, que van disminuyendo en tamaño distalmente. Ojos discreto, circulares.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Especie conocida sólo de una larva colectada en La Retuerta de Pina (Pina de Ebro).

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Los Erythraeidae son ácaros que en estado larvario parasitan a diversos órdenes de insectos y arácnidos y en estado adulto son depredadores de ácaros fitófagos. Las larvas que motivaron la descripción de *E. lancifer* fueron colectadas sobre un díptero de la familia Dolichopodidae y en trampas de colores. Es la única especie conocida en el mundo perteneciente al subgénero *Zaracarus* dedicada a la provincia de Zaragoza y derivado de ese nombre y la palabra "ácaro". Todo este material está depositado en el South Australian Museum


BIBLIOGRAFÍA

Southcott, R.V., 1995. A new larval Erythraeine mite (Acarina: Erythraeidae) from Spain. *Acarologia*, 36 (3): 223-228


AGRADECIMIENTO

A R.V. Southcott (Australia)


GALERÍA FOTOGRÁFICA



E. lancifer. Larva. Vista ventral. Fuente: Southcott, 1995.



E. lancifer. Larva. Extremidades. Fuente: Southcott, 1995.

050 *Erythraeus lancifer* (Trombidiformes, Erythraeidae)

E. lancifer. Esquema de del lugar donde se encontró sobre un ejemplar de díptero Dolichopodidae. Fuente: Southcott, 1995.