

036 *Amaranthus viridis* L.



Deslinde, Pina de Ebro (27/08/2013)

Amaranthus viridis L.

NOMBRE VULGAR

Bledo

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Hierba generalmente erecta; hojas ovadas, a veces algo romboideas, con ápice algo emarginado; inflorescencia en espiga terminal, con algunas axilares; flores con 3 tépalos; frutos muy rugosos, de longitud similar a los tépalos o ligeramente mayores.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Amaranthaceae

Plantas siempre herbáceas.

Flores con gineceo súpero y 12 estambres o menos.

Flores con partes poco vistosas, formadas por piezas verdes o poco coloreadas.

Flores generalmente unisexuales, en espigas o glomérulos.

Tépalos y brácteas escariosos, habitualmente terminados en punta.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género *Amaranthus*

Plantas con hojas alternas, generalmente poco divididas.

Flores con estambres libres.

Frutos con una semilla.

Amaranthus viridis

Hojas con el ápice nada o ligeramente emarginado.

La inflorescencia principal es terminal, también con inflorescencia axilares escasas y alargadas. Flores con 3 tépalos, de longitud igual o menor que el fruto.

Fruto muy rugoso.



A. viridis. Detalle de la hoja y el fruto rugoso.

ESPECIES SIMILARES

La inflorescencia en espiga final y glomérulos axilares, las hojas ligeramente escotadas en el ápice, las flores con 3 tépalos y el fruto muy rugoso diferencian a esta especie de los demás *Amaranthus*.

DISTRIBUCIÓN

De origen desconocido, se distribuye por las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. En Aragón se conocen dos citas, una de Tramacastilla (Teruel) y la otra de los alrededores de Zaragoza. En la Comarca se ha localizado en una gravera junto al Ebro en Pina de Ebro.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de regadío. Florece desde mayo hasta diciembre.

036 *Amaranthus viridis* L.



AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA




A. viridis. Detalle de una hoja: haz



A. viridis. Detalle de una hoja: envés



A. viridis. Detalle del tallo.




A. viridis. Detalle de las flores



A. viridis. Detalle de una rama

036 *Amaranthus viridis* L.



A. viridis. Detalle de una espiga con frutos



A. viridis. Detalle del fruto