

064 *Achillea odorata* L.



Vireta, Pina de Ebro (08/06/2014)

***Achillea odorata* L.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Hierba con tallos erectos, simples. Hojas alternas, las intermedias sésiles, las inferiores pecioladas. Capítulos en corimbos compuestos terminales, densos; brácteas involucrales coriáceas, aquilladas. Receptáculo cónico, con brácteas interseminales parecidas a las involucrales. Flores blancas. Aquenios obovoideos, comprimidos, con 2 costillas laterales blanquecinas, sin vilano.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Achillea*

Hojas divididas, sin espinas, alternas.

Capítulos pequeños, en inflorescencia densa más o menos corimbosa.

Receptáculo del capítulo cubierto de escamas consistentes.

Flores exteriores del capítulo liguladas.

Achillea odorata

Hojas pequeñas (1-2 cm) , con 10 pares de folíolos, ensanchándose hacia el ápice,

Lígulas de 1-2 mm.


Flores blancas.



A. odorata. Detalle de las flores blancas

ESPECIES SIMILARES

La otra especie del género *Achillea* presente en la comarca es *A. ageratum*, que tiene flores amarillas.



A. ageratum. Detalle de las flores amarillas

064 *Achillea odorata* L.**DISTRIBUCIÓN**

Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA


Propia de orillas de caminos, campos abandonados o terrenos baldíos evitando las partes más secas de la Comarca. Florece entre junio y julio.

FAUNA ASOCIADA

Cucullia achilleae (Lepidoptera). Planta nutricia

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. odorata. Detalle del tallo



A. odorata. Detalle de hoja inferior: haz




A. odorata. Detalle de hoja inferior: envés



A. odorata. Detalle de hoja superior: haz

064 *Achillea odorata* L.



A. odorata. Detalle de hoja superior: envés



A. odorata. Capítulos florales maduros



A. odorata. Capítulos florales



A. odorata. Capítulos florales maduros



A. odorata. Capítulos florales